



## GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 126 (23/87) du 12 NOVEMBRE 1987

**CEREALES** : Intervenir contre les pucerons dans les levées intervenues avant le premier novembre.

**COLZA** : Regain d'activité des altises sur la façade atlantique.

Attention au *Pseudocercospora* dans les limons de l'Ouest de la Vienne.

/ REUNION DE MELLE du 4 décembre : Penser à votre inscription avant le 20 Novembre. /

## CEREALES

## JAUNISSE NANISANTE

Situation : Des populations de pucerons variables suivant le niveau d'infestation des maïs ou des repous-ses proches sont détectées dans les céréales levées avant le 1er Novembre. Ces populations sont généralement faibles. Les levées intervenues après le 1er Novembre sont pour le moment quasiment indemnes de puce-ron.

Préconisations :

**Céréales levées avant le 15 Octobre** : Ces parcelles doivent déjà avoir reçu un traitement.

**Céréales levées entre le 15 Octobre et 1er Novembre** : Un traitement insecticide est nécessaire, son urgen-ce n'est pas absolue, profiter si possible du désherbage de post-levée précoce à 2 feuilles ou 3 feuilles pour le réaliser.

**Céréales levées après le 1er Novembre** : Aucune intervention ne se justifie.

## COLZA

## ALTISES

Situation : Le temps doux et ensoleillé, enregistré la semaine passé sur une grande partie de la région a entraîné des captures importantes d'altises en cuvette jaune et une activité au champ non négligeable de ces insectes sur la façade atlantique.

Préconisations : Intervenir sur la façade atlantique sur les parcelles qui n'ont pas encore été protégées. Ne pas intervenir ailleurs.

## MALADIES

Situation : Actuellement beaucoup de *Phoma* sur feuilles est visible dans la région. Dans les limons de l'Ouest de la Vienne (Secteur de Latillé notamment), du *Pseudocercospora* a également été décelé à un niveau très important et tout à fait inhabituel pour la saison.

Préconisations :

Contre le *Phoma* : ne pas intervenir.

P.1.31



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt  
SERVICE RÉGIONAL  
DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
13, Rte de la Forêt - BIARD  
86000 POITIERS Tél. : 49.58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes  
Directeur Gérant : J.P. PIQUEMAL  
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel : 145 F.  
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du  
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

**Contre le Pseudocercospora** : on sait que les traitements d'automne même s'ils ont une bonne efficacité sont tout à fait insuffisants pour enrayer la maladie à la reprise du colza au printemps. Néanmoins, **dans la zone concernée, sur des colzas peu développés et en présence de Pseudocercospora important, intervenir avec du carbendazime à 250 g/ha.** Cette intervention aura pour but de freiner la maladie afin de permettre au colza de s'implanter correctement avant l'hiver.

#### Différenciations des symptômes

Le Phoma et le Pseudocercospora se ressemblent beaucoup, mais peuvent être différenciés sur des **symptômes agés**. Sur les taches de Phoma, il y a présence de pycnides (points noirs), ces pycnides n'existent pas chez le Pseudocercospora.

(C) SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.